

## **NAVODILO ZA ZBIRANJE BLATA ZA DOLOČANJE OKULTNE KRVI V BLATU**

2-3 dni pred odvzemom blata ne smete uživati odvajal in sredstev proti driski. Alkohol in aspirin povzročata draženje in s tem blage krvavitve. Vsaj 48 ur pred vzorčenjem se priporoča prekinitev terapije oz. odsvetuje pitje alkoholnih pijač

Potrebno je zbirati tri vzorcev blata iz treh spontanih zaporednih iztrebljanj. Odvzem vzorca ni primeren v času menstruacije (vzorci se odzamejo 3 dni po zaključeni menstruaciji), v primeru driske (vzorci se odzamejo, ko se pacientu uredi prebava) ali krvavečih hemoroidov (vzorci se odzamejo, ko krvavitve ni več).

### **Odvzem vzorcev blata (3 zaporedna iztrebljanja):**

V posodico številka 1 z žličko na pokrovu odzimate za lešnik blata iz različnih delov iztrebka. Posodici številka 2 in 3 polnite ob naslednjih dveh zaporednih iztrebljanjih na enak način kot posodico številka 1.

Posodice z vzorci blata do transporta v laboratorij hranite na hladnem. Posodice v laboratorij dostavite v čim krajšem času oz. najkasneje tretji dan po iztrebljanju 1. vzorca.

## **NAVODILO ZA ODVZEM VZORCEV BLATA ZA DOLOČITEV PARAZITOV**

Po aplikaciji odvajalnih sredstev, antibiotikov in antimalarikov se spremeni črevesna flora, zato mora preiskovanec vzorce za pregled blata na parazite odvzeti pred aplikacijo naštetih zdravil ali pa 7 dni po aplikaciji. Priporoča se odvzem 3 vzorcev blata v 10 dneh (odvzem vsak drugi dan). Odvzem dveh ali več vzorcev blata v istem dnevu ni pravilen prav tako ne odvzem treh vzorcev v 3 zaporednih dneh.

Pregled šestih zaporedno odvzetih vzorcev blata se priporoča pri sumu na amebiazo.

Vzorcju blata ne smeta biti primešana urin ali voda, zato je najprimernejše iztrebljanje v plastično vrečko, položeno v straniščno odprtino.

Vzorec blata se odzame v standardno plastično posodico z žličko, ki mora biti opremljena z ustreznimi podatki preiskovanca. Z žličko na pokrovu v posodico odzimate za lešnik blata iz različnih delov iztrebka. Vzorce hranite na hladnem in jih takoj po odvzemu oz. v najkrajšem času dostavite v laboratorij.

Če je iztrebku primešana sluz ali kri, odzamemo v posodico sluzasti ali krvav del blata.